TEMA C

1) **Qual è il rischio principale della disfagia?**
   A. Vomito
   B. Disidratazione
   C. Aspirazione
   D. Diarrea

2) **Qual è la via di somministrazione più rapida?**
   A. Orale
   B. Intramuscolare
   C. Sottocutanea
   D. Endovenosa

3) **Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", vi è:**
   A. La tutela contro gli atti di violenza
   B. La tutela del diritto alla autodeterminazione
   C. La tutela del diritto alla privacy
   D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale

4) **Le crisi generalizzate tonico-cloniche durano in genere:**
   A. 10 minuti
   B. 1-2 minuti
   C. 30 minuti
   D. 60 minuti

5) **Un INR terapeutico per paziente in terapia anticoagulante orale è generalmente:**
   A. 0.8-1.2
   B. 1-1.5
   C. 2-3
   D. 4-5

6) **In caso di sospetta sepsi, quale parametro è fondamentale monitorare precocemente?**
   A. BMI
   B. Lattati
   C. Colesterolo
   D. Calcio

7) **Quale parametro è più sensibile per valutare lo stato di idratazione nell'anziano?**
   A. Pressione arteriosa
   B. Frequenza cardiaca
   C. Diuresi
   D. Temperatura

8) **In un paziente con BPCO, quale target di saturazione è generalmente raccomandato?**
   A. 98-100%
   B. 95-98%

C. 88-92%
D. 85-88%

9) Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?

A. La ginnastica vescicale non è raccomandata
B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore
C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore
D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere

10) La chiusura della valvola tricuspidale durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:

A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro
B. Dal sinistro destro nell'atrio sinistro
C. Atrio sinistro nell'aorta
D. Atrio destro nell'arteria polmonare

11) Come si calcola il BMI (Body mass index o IMC Indice di Massa Corporea):

A. Peso ÷ Altezza
B. Peso + Altezza
C. Peso – Altezza
D. Peso ÷ Altezza al quadrato

12) I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:

A. Accuratezza, essenzialità, veridicità
B. Chiarezza, pertinenza, tempestività
C. Completezza e tracciabilità
D. Tutte le precedenti

13) E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:

A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci
B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide
C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.
D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva

14) Un infermiere sta spiegando le modalità di trasmissione dell'epatite A ad un collega in addestramento. Qual è la sequenza corretta della catena dell'infezione?

A. Soggetto infetto-feci-vettore/veicolo-apparato gastroenterico
B. Soggetto infetto-vettore-circolo ematico-cute lesa
C. Soggetto infetto-apparato gastroenterico-trasmissione da contatto-feci
D. Trasmissione da contatto -apparato gastroenterico-soggetto infetto

15) Quale parametro indica una possibile insufficienza respiratoria?

A. SpO2 < 90%
B. PA 120/80
C. FC 70

D. Temperatura 36.5

16) In un paziente con demenza, agitazione improvvisa può indicare:

A. Progressione della malattia
B. Infezione
C. Miglioramento
D. Effetto placebo

17) Qual è il segno più precoce di shock ipovolemico?

A. Ipotensione
B. Tachicardia
C. Bradicardia
D. Ipotermia

18) Qual è il valore normale della saturazione di ossigeno (SpO2)?

A. 85-90%
B. 90-92%
C. 95-100%
D. 80-85%

19) Qual è il principale rischio dell'uso cronico di benzodiazepine nell'anziano?

A. Ipertensione
B. Cadute
C. Diabete
D. Infezioni

20) In caso di iperkaliemia, quale alterazione ECG è più tipica?

A. Onde T appuntite
B. Onde P alte
C. QT lungo
D. Blocco AV completo

Domande a risposta breve aperta

1) Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ictus in fase acuta

2) Indicare 4 principali manifestazioni cliniche del paziente con cirrosi epatica